

## HIPERPLASIA INFLAMATÓRIA FIBROSA: INFORME DE CASO CLÍNICO E TERAPÊUTICA CIRÚRGICA

Márcia Cristina Ferraz<sup>1</sup>  
 Kristian Fernando Novelo<sup>2</sup>  
 Camila Zattera<sup>3</sup>  
 Marcela Nardi<sup>4</sup>  
 Berthyelle Padova Nyland<sup>5</sup>  
 Karin Berria Tomazelli<sup>6</sup>

**INTRODUÇÃO:** A hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI) é caracterizada por uma proliferação benigna oriunda de trauma crônico de baixa intensidade, responsável por desencadear resposta inflamatória do tecido conjuntivo fibroso, frequentemente relacionado ao uso desarmonioso de próteses. Clinicamente trata-se de uma lesão exofítica ou proeminente, geralmente com baseséssil e coloração assemelha-se a mucosa adjacente, habitualmente seu crescimento é lento e assintomático. **OBJETIVOS:** O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de HFI com intuito de contemplar os acadêmicos com conhecimento que os permitam diagnosticar e oferecer terapêutica apropriada. **METODOLOGIA:** Relato do caso clínico. Paciente D.C., 46 anos sexo feminino, leucoderma, natural de Xanxerê-SC, procurou o serviço odontológico relatando dor em região de mucosa alveolar de mandíbula anterior e dificuldade mastigatória há aproximadamente um ano, a mesma informou utilizar prótese total inferior por mais de 20 anos, sem troca da mesma durante esse tempo. Na anamnese geral foi constatado que a paciente apresenta quadros depressivos e que a mesma faz uso de medicações antidepressivas, para essa finalidade. No exame intraoral observou-se aumento de volume na base anterior da mandíbula com superfície lisa e brilhante, base séssil, coloração congênere a da mucosa, sem sinais de infecção fúngica relacionada à lesão e casualmente sintomática. Foi verificada também desadaptação de prótese total inferior em região anterior, onde foi verificada a lesão. **DISCUSSÃO:** O diagnóstico clínico foi HFI traumático. A conduta inicial foi realizar a confecção de uma prótese total inferior e, por conseguinte a biópsia excisional da lesão, o

---

<sup>1</sup> Acadêmica do Curso de Odontologia da UCEFF

<sup>2</sup> Acadêmica do Curso de Odontologia da UCEFF

<sup>3</sup> Acadêmica do Curso de Odontologia da UCEFF

<sup>4</sup> Acadêmica do Curso de Odontologia da UCEFF

<sup>5</sup> Graduada em Odontologia, doutora em Dentística, docente do Curso de Odontologia da UCEFF

<sup>6</sup> Graduada em Odontologia, mestre em Diagnóstico Bucal, docente do Curso de Odontologia da UCEFF

E-mail: karintomazelli@gmail.com.

qual foi devidamente encaminhado para a análise histopatológica. Microscopicamente, foi observado epitélio pavimentoso estratificado apresentando hiperplasia e tecido conjuntivo com elevada quantidade de fibras colágenas e presença de infiltrado inflamatório crônico, solidificando o diagnóstico clínico. Após 15 dias pós-cirúrgico constatou-se um excelente reparo tecidual, sem indício de recidiva da lesão, confirmando o prognóstico bom para HFI.

**CONCLUSÃO:** A HFI acomete principalmente usufruidores de próteses mal adaptadas. Trata-se de uma lesão traumática proliferativa de tecidos moles preponderante na cavidade oral. Vale lembrar que outros fatores traumáticos podem desencadear HFI. Ao almejar o sucesso da terapêutica, torna-se fundamental a remoção cirúrgica e retirada do agente causador. É essencial que o cirurgião-dentista esteja qualificado a realizar um diagnóstico correto visando uma terapêutica eficiente, promovendo o reestabelecimento da saúde oral do paciente, visto que se refere a uma lesão de frequente aparição nos serviços odontológicos.

**Palavras-chaves:** Hiperplasia. Inflamação. Fibrose.

## REFERÊNCIAS

BARROS Rosana Mara Giordano, CAMPOS Kimberley dos Santos Moura, CABRA Lais Maksoud L. **Relato de caso clínico de hiperplasia fibrosa inflamatória.** Araçatuba 2014. Disponível em: <http://apcdaracatuba.com.br/revista/2015/03/TRABALHO%202.pdf>. Acesso em setembro 2017.

BATISTA Victor Eduardo de Souza; BATISTA, Fábio Roberto de Souza, PAVAN, Ângelo José, MATHEUS Gildo, SILVA Marcell Moço. **Hiperplasia fibrosa inflamatória ocasionada por prótese total desadaptada.** Relato de caso. Araçatuba 2013. Disponível em: <http://apcdaracatuba.com.br/revista/2014/08/trabalho%2012.pdf>. Acesso em setembro 2017.

FALCÃO, Antônio Fernando Pereira; LAMBERTI, Patrícia Leite Ribeiro; LORENS, Felipe da Gama Lobo; LACERDA, Juliana Andrade; NASCIMENTO, Bruno Campos. **Hiperplasia fibrosa inflamatória: relato de caso e revisão de literatura.** Salvador 2009. Disponível em: [http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/20620/1/17\\_v.8\\_2.pdf](http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/20620/1/17_v.8_2.pdf). Acesso em setembro 2017.

SANTOS, Marconi Eduardo Sousa Maciel; COSTA, Wilson Rodrigo Muniz; SILVA NETO, Joaquim Celestino. **Terapêutica cirúrgica da hiperplasia fibrosa inflamatória - relato de caso.** Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 2004. Disponível em: <http://www.revistacirurgiabmf.com/2004/v4n4/pdf/v4n4.6.pdf>. Acesso em setembro 2017.